النبت المجهرى الجرثومى لخراجات وجروح الإبل الليبية

أبو عجيله الترهوني¹ ، أمال المزوغي² ، محمد أبورقيه² ، كمال بن زيد¹ ، عائشة فريوان¹

¹ مركز البحوث الزراعية والحيوانية-طرابلس-ليبيا

² كلية الطب البيطري-جامعة الزيتونة-ترهونة-ليبيا

tarhuni.aha@gmail.com

المستخلص:

الزرع المخبري لعدد 402 عينة مسحية من خراجات والجروح بالإبل الليبية في عدد 11 منطقة بليبيا، أثبت وجود تسعة أجناس من البكتيريا. أعلى نسبة فيها كانت للوتدييات المولدة للصديد بنسبة 44.3%، وتمثلت في (الوتدية القحبية، الوتدية الغنمية، الوتدية الكاذبة)، العنقوديات بنسبة 17.7% وتمثلت في (العنقودية الذهبية، العنقودية الجلدية)، 9.6% الأشريكيات وتمثلت في (الأشريكية القولونية)، 5.8% الكلابسيلا وتمثلت في (الكلابسيلا الرئوية)، 3.8% الإمعائيات وتمثلت في (الإمعائية أيرو جنورا)، 3.6% الزوائف وتمثلت في (الزائفة الزنجارية)، 4.4% المتقلبات وتمثلت في (المتقلبة الإعتيادية)، 4.1% العصويات وتمثلت في (العصوية الرقيقة)، فيما شكلت المكورات الدقيقة 6.6% من هذه العزلات.

التوزيع الجغرافي للعزلات الجرثومية سجل أعلى نسبة لها في منطقة ترهونة ومسلاته، وكان أداها في منطقة مصراته. أعلى معدل للعزلات الجرثومية كان خلال فصل الربيع حيث كانت 70.1% وأداها كان خلال فصل الصيف بنسبة 7.8%. اختبارات الحساسية الدوائية أظهرت فاعلية عقار الجنتاميسين على معظم العزلات الجرثومية.

الكلمات المفتاحية: الجروح، الخراجات، الوتدية، القحبية، المكورات، الأشريكية القولونية، الكلابسيلا الرئوية.

المقدمة:

يتميز الجمل العربي (*Camelus dromedarius*) بقدرته على التكيف مع الظروف البيئية القاسية (Schwartz, 1992) وتحمله للإجهاد الشديد في مواسم الجفاف الطويلة، والعيش في المنطقة القاحلة وشبه القاحلة في الصحراء العربية (Agab, 1993). وقد تم إدخاله بنجاح إلى مناطق أخرى مثل أستراليا ويتصف بأنه ذو مردود اقتصادي من اللحم والحليب (Knoess, 1979)، كما أن له القدرة الفسيولوجية للحفاظ على معدل فقد الحراري في بيئته الصحراوية المتقلبة (McDonald et al., 1981).

1. الجروح و الخراجات في الإبل: يعتبر الجلد أحد أهم الأعضاء الحسية المتصلة بالوسط الخارجي حيث يوفر حاسة اللمس وكذلك الحماية من المؤثرات الخارجية، ويعد جلد الإبل من أقوى وأسمك الجلود وأثقلها وزناً بما يقارب 60% عنها لدي حيوانات المزرعة الأخرى حيث يقدر سمكه بـ 0.6 ملم، ويمتاز بطبقة البشرة التي يغلب عليها صباغ الميلانين الأسود والتي تعتبر متطورة ونامية well developed بشكل جيد، وكذلك طبقة الأدمة dermis الكثيفة بالألياف المرنة elastic fibrou (Manefield & Tinson, 1996).

الإصابة بالجروح تؤدي لتمزق الجلد الأمر الذي يسمح بسهولة الغزو الجرثومي للأنسجة الداخلية للجسم وإمكانية إحداث الصور المرضية المختلفة (Tyagi & Singh., 2012)، وبالتالي حدوث تغيرات التهابية ونخرية (Sahoo & Ganguly, 2015; O'Conner, 2005).

تعتبر الجراثيم المسببة للخراجات ذات طبيعة مولدة للصدید pyogenic والتي يمكن أن تنتقل إلى الحيوانات الأخرى بطرق مختلفة، وفتح الخراجات بطريقة عشوائية يمكنه أن يؤدي إلى تلوث الحظيرة وبالتالي نشر العدوى بين القطيع المرافق من خلال تناثر محتوياته علي الأعلاف والمياه التي يتناولها الحيوان، ولعل انتشارها سيكون أوسع في حال حدوثه في المراعي، كما أن الإصابة قد تمتد إلى الإنسان من خلال المفصليات المختلفة كالذباب flies والقراد ticks، والخراجات عبارة عن استجابة التهابية لحماية المكان من الغزو الجرثومي حيث يحدث نشاط للخلايا الدفاعية مما ينتج عنه تكون الصدید أو القيح pus وحدث التهاب العقد الليمفاوية، مما يؤدي إلى حدوث تغيرات نسيجية في موقع الإصابة بما فيها حدوث النخر necrosis ، كما أن وفرة الخلايا البيضاء المتعادلة neutrophils ذات الأهمية المباشرة في التصدي للغزو الجرثومي باعتبارها من أهم الخطوط الدفاعية في الجسم، وتكاثرها والزيادة في أعدادها مما يتسبب في تكوين الصدید (Chaudhary, 1978).

في دراسة مسحية بالسودان بين (Agab & Abbas, 1998) بان الجروح والخراجات كانت ثالث أكبر مشكلة مرضية تؤثر على الإبل وتتركز ذروة حدوثها خلال مواسم الأمطار والإصابة بقراد كثيف خلال الصيف وأرجعت أسباب الجروح إلى الشجيرات الشوكية التي ترعى فيها قطعان الإبل.

ذكر (Bengoumi et al., 2000) في دراسة مسحية قام بها في جنوب المغرب أن (5%) من الأسباب الرئيسية لنفوق الحيوان كان بسبب الخراجات ، فيما سجل (Qureshi et al., 2002) عزلات من المكورات العنقودية الذهبية قدرت ب (23.39%) ، كعزلة نقية أو مختلطة ببكتيريا أخرى. في حين كشفت نتائج إختبارات الفحص البكتريولوجي المدعمة بالكيمياء الحيوية التي قام بها (Thabet, 1993) كشفت أن أسباب الخراجات الجلدية كانت بكتريا *Corynebacterium pygoenes* بنسبة بلغت (66.67%). (Ismail et al., 1990) عزل بكتيريا في دراسته للخراجات المغلقة في المناطق الصدرية والتي شملت الكتف والبطن والرأس وأطراف الإبل عدداً من أنواع البكتيريا تضمنت *Staphylococcus spp*، بكتيريا *orynebacterium spp*، *Streptococcus spp*، *Ecoli*، *Klebsiella spp*، *Proteus spp*. وفي كينيا عزل (Esterabadi et al., 1975) بكتيريا *Corynebacterium spp* في حالة لخراج قُدر حجمه بالبرتقالة أو أكبر.

2. الأهمية الاقتصادية (Economic importance): لا شك أن إصابة الإبل بأي حالة مرضية يعد ذو أهمية اقتصادية بسبب فقدانه للشهية وبالتالي هزاله وضعف تكوينه البدني وهبوط سعره (Alharbi & Mahmoud, 2012) ، وقد تسبب تكرار وجود الخراج في نفوق بعض الإبل (Younan et al., 2007) وحدثت الخراجات قد يؤدي إلى الحد من حركته سواء بالمرعى أو الحظيرة، علاوة على إمكانية حدوث امتداد العدوى infection إلى الأعضاء الداخلية للحيوان وأهمها وصول الكائن الممرض إلى العقد اللمفاوية (من أكثر الأمراض المزمنة التي تصيب الإبل هي التهاب العقد اللمفاوية Caseous lymphadenitis؛ Oliveira et al., 2014) وما يترتب عنها من استجابة التهابية وانتشارها ببعض الأعضاء الحيوية كالكلبد، العنق والرئة (Wernery & Kinne, 2016; Venugopalan, 2000)، وهذه قد تؤدي بالتالي إلى إعدام جزئي أو كلي لهذه

الأعضاء تبعاً للإصابة، الجروح هي الأخرى قد تكون هدفاً للغزو الطفيلي ببقرات الطفيليات التي يمكنها أن تحفر أنفاقاً بجسم الحيوان وتسبب له اضطراباً قد يمنعه من تناول الطعام وبالتالي هزاله مما يؤدي الي انخفاض جودة اللحوم ويؤثر سلبي على التسويق والاستهلاك (Ranjan *et al.*, 2018). كما أن جرح الضرع في النوق الحلوب قد يؤدي إلي حدوث عدوى جرثومية يسبب التهاب الضرع ونقص إفراز الحليب وتلوثه بالجراثيم (Abdel-Rahman *et al.*, 2017) مؤدية إلي تدني معدل إنتاج الحليب ، وإصابة الحوار الرضيع بالإسهال الذي قد يفضي بها للنفوق. من جانب آخرالمعالجة الدوائية قد تطول وتتضمن تكاليف مالية وقد لا تتجح، ومن الممكن تطور الإصابة إلي غرغرينه Gangareanous infection ليتم حينها اللجوء لاستئصال الضرع بكامله جراحياً ، ولعل ما ذكره (الترهوني وآخرون، 2005) حول العزلات الجرثومية المسببة لالتهاب الضرع في النوق يؤكد انتشار هذه الجراثيم (الوتدية القححية، الإشريكية القولونية، العنقودية الذهبية) في البيئة المحيطة بالإبل والتي من شأنها إحداث المرض وما يمكن أن ينجم عنه. وجود الجروح والخراجات الظاهرية على جسم الجمل يعد عاملاً نفسياً مؤثراً للمشتري إذ أن هذه الحالات قد تنفر المشتري وبالتالي حدوث الكساد التجاري. إذا ظهر على جلد الذبيحة المصابة بالخراج بعض التغيرات منها كونه جلد مزركش في المسالخ مما يجعله غير مرغوب من قبل المشتري (Borham *et al.*, 2016).

3. الصحة العامة والبيئة (Ecology and Public health): لعل انتشار الخراجات بهذا الكم في الإبل المحلية يعد مؤشر سلبي حول صحة هذا الحيوان، كما أن فتح هذه الخراجات بطريقة عشوائية دون أدني اكتراث قد يؤدي إلي نشر الجراثيم المسببة للقيح في البيئة، مما يعرض حياة الإنسان والحيوان إلي خطر محقق، فهذه الجراثيم قد تنتقل بطرق متعددة من أهمها المفصليات arthropods إلي أماكن مختلفة من بينها طعام الإنسان. أن وجود جرح أو خراج بالضرع في النوق سيؤدي إلي حدوث عدوى جرثومية infection قد تحدث بسببه نقل العدوى إلي الحيران الرضيعة وكذلك المستهلكين لهذا الحليب.

الافتقار الظاهر للدراسات الميدانية دفع العديد من الباحثين إلى اعتبار الجمال مقاومة للأمراض التي تصيب المواشي عادة في نفس المنطقة (Knoess, 1977)، الجمال عرضة لمجموعة واسعة من العوامل المسببة للأمراض البكتيرية.

المواد والطرق:

1. جمع العينات.

من خلال الزيارات الميدانية لأماكن تجمعات الإبل بمناطق مختلفة من ليبيا، تم اختيار الحيوانات التي تعاني من وجود خراجات وجروح سطحية وتقييد حركتها وفقاً لما ذكره (Gahlot & Chouhan, 1992)، تم جمع العينات من الجروح والخراجات المختلفة بواسطة مسحات مخبرية مجهزة لهذا الغرض، ونقلها في حاوية مبردة إلي المختبر لزرعها.

2. الزرع الجرثومي.

جري الزرع الجرثومي على أوساط زراعيه مختلفة من أجار الدم Blood agar وأجار الماكونكي (MacConkey agar) وحضنها على درجة حرارة 37 درجة مئوية لمدة 24 - 48 ساعة تحت الظروف الهوائية، أعقبها عملية التصنيف الجرثومي بواسطة استخدام نظام Api & Mueller أي بي إي - (مريال).

3. اختبار الحساسية.

الغرض من هذا الاختبار هو تحديد مدى مقاومة العزلات الجرثومية من الخراجات والجروح المختلفة وذلك لعدد 15 نوع من المضادات الحيوية شائعة الاستعمال في الحقل البيطري وهي:

ت	المضاد الحيوي	رمز المضاد	ت	المضاد الحيوي	رمز المضاد
1	Ampicilline	AK	9	Penicilline	P
2	Amoxycillin	AMP	10	kanamycine	ATC
3	Streptomycine	SPT	11	Tetracycline	TE
4	Gentamycine	CN	12	Linkomycine	L- MY
5	Neomycine	N	13	Vancomycine	VA
6	Erythomycine	E	14	Bacitracine	B
7	Cloxacilline	CX-OB	15	Cephaloxine	CE
8	Chlormphenicol	C			

النتائج والمناقشة:

1. أجناس وأنواع العزلات الجرثومية.

العزلات الجرثومية سجلت 9 أجناس جدول (1) وعدد من الأنواع (جدول 2). كان أعلى نسبة فيها للوتدييات المسببة للصديد بنسبة 44.3%، وتمثلت في الوتدية القيحية *Corynebacterium pyogenes*، الوتدية الغنمية *C. bovis*، الوتدية الكاذبة *C. Pseudotuberculosis*، العنقوديات بنسبة 17.7% وتمثلت في العنقودية الذهبية *Staphylococcus aureus*، العنقودية الجلدية *S. Epidermics*، 9.6% الأشريكيات *Eshrecia* وتمثلت في الأشريكية القولونية *Eshrecia coli*، 5.8% الكلابسيلا *Klabsiella* وتمثلت في الكلابسيلا الرئوية *Klabsiellapnemonae*، 3.8% الإنتيروباكتر *Enterobacter* وتمثلت في الإنتيروباكترأيروجينورا *Enterobacteraerogenosa*، 3.6% انزنجارية *Pseudomonas* وتمثلت في الزنجبارية المتموجة *Pseudomonas erogenosa*، 4.4% البروتيويس *Proteus* وتمثلت في البروتيويس فولقارس *Proteus vulgaris*، 4.1% العصويات *Bacillus* وتمثلت في العصوية سبتاليس *B. subtilis*، 6.7% والمكورات الدقيقة *Micrococcus*.

جدول (1) الأجناس البكتيرية التي تم عزلها من الجروح والخراجات في الإبل الليبية

النسبة المئوية %	عدد العزلات	الأجناس البكتيرية	الجنس
44.3	305	CNBT	الوتدييات <i>Corynebacterium</i>
17.7	122	SFCO	العنقوديات <i>Staphylococcus</i>
9.6	66	EHRL	الإشريكييات <i>Eshrecia</i>
6.7	46	MICO	المكورات الدقيقة <i>Micrococcus</i>
5.8	40	KLAB	الكلاسييلات <i>Klabsiella</i>
4.4	30	PROT	المتقلبات <i>Proteus</i>
4.1	28	BCLE	العصويات <i>Bacillus</i>
3.8	26	ENBT	الإمعائيات <i>Enterobacter</i>
3.6	25	PSMN	الزوائف <i>Pseudomonas</i>
100	688		المجموع

الشكل (1) يوضح الأجناس البكتيرية التي تم عزلها من الجروح والخراجات في الإبل الليبية

جدول (2) أنواع العزلات الجرثومية التي تم تصنيفها بالخراجات والجروح المختلفة.

عدد العزلات			الجراثيم المعزولة
المجموع	الجروح	الخراجات	
137	28	109	<i>C. Pyogenes</i> الوتدية القيحية
89	26	63	<i>C.bovis</i> الوتدية البقرية
79	21	58	<i>C.Pseudotuberculosis</i> الوتدية السالبة الكاذبة
93	23	70	<i>S. Aureus</i> العنقودية الذهبية
29	18	11	<i>S.Epidermics</i> العنقودية الجلدية
66	48	18	<i>Eshrecia coli</i> الأشريكية القولونية
40	11	29	<i>K. Pnemonae</i> الكلابسيلا الرئوية
26	13	13	<i>Enterobacter aerogenosa</i> الإنتيروباكتريا أيروجينورا
25	11	14	<i>Pseudomonas erogenous</i> الزائفة الزنجارية
30	17	13	<i>Proteus vulgaris</i> المتقلبة الاعتيادية
28	12	16	<i>B.subtlis</i> العصوية الرقيقة
46	15	31	<i>Micrococcus</i> المكورات
688	445	243	المجموع

2. التوزيع الجغرافي للعزلات الجرثومية.

التوزيع الجغرافي للعزلات الجرثومية خلال هذه الدراسة كان مرتبطاً بعدد العينات التي تم جمعها من المناطق المختلفة، فنجد أن أعلى نسبة من العزلات كانت من ترهونه ومسلاته تلتها العسة لتكون في أقل نسبة في المرقب بعدد عزلتين فقط، وتعد الوتدية القيحية من أهم العزلات حيث كانت مرتفعة في سبها، ترهونه ومسلاته، العسة، الزواية. أعلى النسب من العزلات الجرثومية كانت لأجناس الوتديات، العنقوديات، والإشريكيات وتضمنت أغلب المناطق جدول (3).

3. موسمية العزلات الجرثومية :

سجلت هذه الدراسة أعلى معدلات للعزلات الجرثومية خلال فصل الربيع حيث كانت 70.1 % ثم الشتاء 13.2 % فالخريف 8.9 % وأخيراً الصيف بنسبة 7.8 % جدول (4).

جدول (3) التوزيع الجغرافى للمعزلات الجرثومية فى المناطق الإدارية التى تضمنتها الدراسة.

المجموع	المعزلات الجرثومية												المناطق الإدارية
	المكورات <i>Micrococcus</i>	العصوية الرقيقة <i>B. subtilis</i>	المتقلبة الإعتيادية <i>Proteus vulgaris</i>	الزائفة الزنجارية <i>pseudomonas</i>	الإمعاينية إيروجينو <i>erogenus</i> <i>Enterobacter</i>	<i>aerogenes</i>	الكلاسيلا الرئوية <i>K pneumoniae</i>	الإشريكية القولونية <i>Escherichia coli</i>	العنقودية الجلدية <i>S. epidermidis</i>	العنقودية الذهبية <i>S. aureus</i>	التوتدية نظيرة السليبية <i>C. Pseudotuberculosis</i>	توتدية البقرية <i>C. bovis</i>	
206	8	9	11	7	5	13	16	9	33	20	18	47	ترهونة مسلاته
131	10	4	6	5	4	9	14	6	21	13	16	23	العدة
80	4	6	3	2	1	5	11	7	9	10	10	12	تاجوراء
64	6	2	5	1	5	4	3	-	8	9	12	9	طرابلس
49	3	3	-	-	7	2	5	1	4	8	7	9	الجفارة
56	4	1	3	1	2	1	2	1	7	9	15	10	الزواية
37	2	1	1	6	1	-	3	2	5	6	4	6	ج الغربى
46	9	1	1	3	1	6	1	3	3	4	6	8	بنى وليد
14	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	11	سبها
3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	المرقب
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	مصراته
688	46	28	30	25	26	40	66	29	93	79	89	137	المجموع

جدول (4) العزلات الجرثومية خلال المواسم المختلفة.

المجموع	فصول السنة				العزلات الجرثومية
	الخريف	الصيف	الربيع	الشتاء	
137	12	11	96	18	<i>C. Pyogenes</i> الوتدية القيحية
89	8	7	62	12	<i>C. bovis</i> الوتدية البقرية
79	7	6	56	10	<i>C. Pseudotuberculosis</i> الوتدية السلبة الكاذبة
93	8	8	65	12	<i>S. Aureus</i> العنقودية الذهبية
29	3	2	20	4	<i>S. Epidemics</i> العنقودية الجلدية
66	6	5	46	9	<i>Eshrecia coli</i> الأشركية القولونية
40	4	3	28	5	<i>K. Pnemonae</i> الكلابسيلا الرئوية
26	2	2	18	4	<i>Enterobacter aerogenosa</i> الإنتيروباكتريوجنورا
25	2	2	18	3	<i>Pseudomonas erogenous</i> الزائفة الزنجارية
30	3	2	21	4	<i>Proteus vulgaris</i> المتقلبة الإعتيادية
28	2	2	20	4	<i>B. subtilis</i> العصوية الرقيقة
46	4	4	32	6	<i>Micrococcus</i> المكورات
688	61	54	482	91	المجموع
100	8.9	7.8	70.1	13.2	%

4. اختبار الحساسية الدوائية :

النتائج المخبرية دلت على قوة عدد من المضادات الحيوية على الجراثيم موجبة الغرام Gram positive bacteria (العنقوديات، المكورات الدقيقة، الوتديات والعصويات) وتمثلت ذلك في الأموكسيسيلين، الجنتاميسين، الستريبتومايسين، الكلورمفينيكول، الكاناميسين والنيومايسين، ودرجة أقل حساسية مع التتراسيكلين، والكلوكساسيلين.

الجراثيم سالبة الغرام Gram negative bacteria (الإشريكيات، الكلابسيلا، الإنتيروباكتري، البروتوس، الزنجاريات) كانت أكثر حساسية للأمبيسلين، والجنتاميسين أكثر من غيرها.

5. العزلات الجرثومية: Bacterial Isolates

قام العديد من الباحثين بعزل مجموعة من الجراثيم من الآفات الجلدية المختلفة (Ismail et al., 1990; Tadesse & Molla, 2002)، إلا أن أحد لم يتمكن من وضع افتراض محدد لأي عزله جرثومية واحدة لتكون السبب الجوهري والأساسي للخراجات، مما يجعل الموضوع مازال مفتوحاً على مصراعيه للبحث والنقضي العلمي. العزلات الجرثومية التي سجلتها هذه الدراسة لم تكن بعيدة عن النتائج التي ذكرتها الدراسات المنشورة حول هذا

الموضوع في الدول الأخرى وكذلك في ليبيا، فالوتدية القححية *Corynebacterium pyogenes*، الوتدية البقرية *C. Bovis*، الوتدية الكاذبة *C. Pseudotuberculosis*، العنقودية الذهبية *Staphylococcus aureus* من أكثر الأنواع المسببة للخراج في الإبل (Tejedor et al., 2004; Fouad et al., 2019)، (بالحاج وتمومن، 1992، وعبد الرحيم وآخرون، 1991)، وكانت الوتدية القححية المسبب الأقوى في الإصابة بالخراج حسب دراسة أجراها (Zidan et al., 2013; Meena et al., 2017). وفي عزولات متعلقة بالخراجات، الأشريكية القولونية *Eshrecia coli*، الكلابسيلا الرئوية *Klabisiella pnemonaе*، الإمعائنية أيرو جنورا *Enterobacter aerogenosa*، الزنجبارية المتموجة *Pseudomonas Erogenosa*، المتقلبة الإعتيادية *Proteus vulgaris*، العسوية الدقيقة *B. subtilis*، المكيرات *Micrococcus*.

التوزيع الجغرافي للعزلات الجرثومية خلال هذه الدراسة كان مرتبطاً بعدد العينات التي تم جمعها من المناطق المختلفة، فنجد أن أعلى نسبة من العزلات كانت من ترهونة ومسلاته تلتها العسة لتكون في أقل نسبها في المرقب بعدد عزلتين فقط.

الوتدية القححية والتي كانت أهم العزلات سجلت ارتفاعاً في سبها، ترهونة ومسلاته، العسة، الزواية، ويعود السبب فيها على الأرجح لانتشار هذه الجراثيم في الوسط المحيط بشكل واسع، وهذا يؤكد ما أشارت له الدراسات التي قام بها (المريمي و السعداوي، 1992، 1992، Abuzaid, 1992، التزهوني وآخرون، 2005، Zidan et al, 2013) في العزلات الجرثومية فيما يتعلق بإصابة الأغنام البربرية والأبقار والنوق الليبية بالتهاب الضرع على التوالي.

ارتفاع معدلات العزلات الجرثومية خلال فصلي الربيع والشتاء مرده إلى اعتماد الحيوانات على الرعي واحتمال تلوث المراعي بهذه الجراثيم مما أدى لانتشار العدوى التي يكون مصدرها الإنسان لأنه يحتفظ بالإبل قريبة منه في فصلي الربيع والشتاء (Solanki & Kataria, 2017) علاوة على وجود الحيوانات بمناطق قريبة تجعل من السهولة الوصول إليها وتسجيل هذه المعدلات خلال هذه الفترة.

النتائج المخبرية لاختبار الحساسية دلت على قوة عدد من المضادات الحيوية ضد الجراثيم موجبة الغرام Gram positive bacteria (العنقوديات، المكيرات، الوتديات والعصويات) وتمثلت ذلك في الأموكسيسيلين، الجنتاميسين، الستربتوميسين، الكلورمفينيكول، الكاناميسين والنيوميسين، وبدرجة أقل حساسية مع التتراسيكلين، والكلوكساسيلين، أما الجراثيم سالبة الغرام Gram negative bacteria (الإشريكيات، الكلابسيلات، الإمعائيات، المتقلبات، الزوائف) كانت أكثر حساسية للأمبيسيلين، والجنتاميسين أكثر من غيرها.

بشكل عام يعتبر الجنتاميسين من أقوى المضادات الحيوية التي لها تأثير على العزلات الجرثومية في هذه الدراسة. وهذا يتفق مع دراستها أثبتت أن الجراثيم موجبة الغرام وخاصة العسوية لم تظهر أي مقاومة للجنتاميسين entamicin والتتراسيكلين tetracycline مع ملاحظة المقاومة القسوى ضد الامبيسيلين و الينسلين ampicillin and penicillin-G (Solanki & Kataria, 2017).

الخلاصة:

من خلال هذه الدراسة تم التعرف علي النبت ألمجهرى الجرثومي للجروح والخراجات وتحديد أهم الأجناس البكتيرية والتوزيع الجغرافي وتأثير المواسم في انتشارها وطرق العلاج والاستجابة الدوائية للمضادات الحيوية. وهذا

يدعونا إلى ضرورة الاستمرار في إجراء المزيد من الدراسات حول هذه الحالات المرضية وعلى نطاق أوسع لتحقيق حل جذري لهذه المشكلة، والسعي لإيجاد لقاح يمكنه الحد من هذه الظاهرة بل والقضاء عليها، كما أن العزلات الجرثومية التي بينتها هذه الدراسة تعد كلها ذات خطورة علي صحة الإنسان ويمكنها أن تؤدي لإصابته بالعديد من الحالات المرضية.

المراجع :

المريمى، أبوالقاسم و السعداوي، محمد. (1992). إلتهاب الضرع في نعاج البربري. مداولات المؤتمر الطبي البيطري المغاربي العاشر. طرابلس - ليبيا. ص : 92-93.

الترهوني، أبو عجيبة ؛ الفرجاني، كريم؛ بن زيد، كمال، و الجعودي، نورالدين. (2005). العزلات الجرثومية المسببة لإلتهاب الضرع في النوق الليبية. المؤتمر الوطني الثالث للتقنيات الحيوية، سبها- ليبيا.

المعجم الطبي الموحد، إنجليزي - عربي- فرنسي. (1983). الطبعة الثالثة. ميدلفانت - سويسرا.

بالحاج، خالد محمد و تمومن، سمير خليفه. (1992). التورمات الجراحية في الإبل الليبية. مداولات المؤتمر الطبي البيطري المغاربي العاشر. طرابلس - ليبيا. ص : 92-93.

تمومن، سمير خليفة و بالحاج، خالد محمد. (1992). إلتهاب العقد الليمفاوية التجبني. مداولات المؤتمر الطبي البيطري المغاربي العاشر. طرابلس - ليبيا. ص : 92-93.

عبدالرحيم، عبدالرحيم إدريس ؛ بالحاج، خالد و محمد الزرقاني. (1991). إصابات الإبل الليبية والفاقد الإقتصادي نتيجة الإعدامات بالسلخانات. "دراسة أولية". مداولات المؤتمر الدولي حول تنمية وتطوير إنتاج الإبل. طبرق - ليبيا. ص : 229-237.

Abdel-Rahman, E.H., El-Jakee, J.K., Hatem, M.E., Ata, N.S. & Fouad, E.A. (2017) Preparation of goat and rabbit anticamel immunoglobulin G whole molecule labeled with horseradish peroxidase. *Vet. World*, 10(1): 92-100

Abuzaid, Y. M., (1992). A study subclinical mastitis in a dairy farm in Libya. 10 *MagharibVete. Med conf. Tripoli- Libya*. P: 263-268.

Agab, H. (1993). Epidemiology of Camel Diseases in Eastern Sudan with Emphasis on Brucellosis: M V Sc. Thesis, University of Khartoum, Faculty of Veterinary Science pp. 184.

Agab, H. & Abbas, B. (1998). Epidemiological studies on camel diseases in the eastern Sudan. *Camel news letter*. 14: 53 . 57.

Alharbi, K.B., & Mahmoud, O.M. (2012): Abscess disease of sheep and goats: A disease of major concern in Saudi Arabia that urges production of an effective vaccine. *J. of Agriculture and Vet. Sci.*, 5(2): 61-72.

Bengoumi, M. ; Gandege , E. B. ; EL - Abrak, A. ; Berrada & Faye, B. (2000). Study of camel calf mortality in south Morocco : retrospective survey precedingof the international workshop on the camel calf , Morocco , 24 - 26 October .*Rev. Elev. Med. et. Pays .Trop.* 53 (2): 132 - 135.

- Borham, M.A., Oreiby, A.F., El-Gedawy, A.A., & AlGaabary, M.H.** (2016). Serological Surveillance of Caseous Lymphadenitis in Sudanese and Somali Camels Slaughtered at Al-warraq Abattoir, Giza, Egypt. *World Vet. J.* 6: 89-94
- Chaudhary, K.** (1978) A Guide to pathology. 5 th ed. Jaypee Brothers, medical publishers, India.
- Esterabadi, A. H. ; Entessar , F. ; Hedayati , H. ; Narimani . A. A. & Sadri, M.** (1975) .Archives de l'Institut Razi . 27 : 61 – 66 .
- Fouad, E. A., Elnaga, A. S. A., & Kandil, M. M.** (2019). Antibacterial efficacy of Moringa oleifera leaf extract against pyogenic bacteria isolated from a dromedary camel (*Camelus dromedarius*) abscess. *Veterinary world*, 12(6), 802.
- Gahlot, T. K., & Chouhan, D. S.** (1992). Camel surgery. 1st edition. Gyan parkashan mandir, Bikaner. India.
- Ismail, M., El-Jakee, J., El- Sayed, Z. E., & Abdel-Rahman, M.** (1990). Microorganisms associated with closed abscesses of camels in Egypt. *Veterinary Medical Journal Giza*. 38: 53-62.
- Knoess, K. H.** (1977). The camel as meat and milk animal. *World Animal Review*. 22:1, 39-44.
- Knoess, K. H.** (1977). The milch domedry. The camelid: an all-purpose animal In Proceedings of Khartoum workshop on Camel (pp. 176-95)
- Manefield, G. W., & Tinson, A. H.** (1996). Camels: *A compendium* (No. 22). Post Graduate Foundation in.
- Meena, D., Sharma, S. K., Meena, V. K., & Kataria, A. K.,** (2017). Resistotyping of Camel Skin Wounds Associated Staphylococcus aureus on the Basis of Multidrug Resistance Pattern. *Journal of Camel Practice and Research*, 24(1), 67-71.
- McDonald, P.; Edwards , R. A. & Greenhalgh, J. F. D.**(1981) .Longman Group limited, Longman house, Burnt mill, Harlow. Essex.
- O'Conner, J.J.,** (2005). Doller's Veterinary Surgery, 4thEdn. CBS Publishers & Distributers, New Delhi, pp: 770.
- Oliveira, M., Barroco, C., Mottola, C., Santos, R., Lemsaddek, A., Tavares, L., & Semedo-Lemsaddek, T.** (2014). First report of Corynebacterium pseudotuberculosis from caseous lymphadenitis lesions in Black Alentejano pig (*Sus scrofa domesticus*). *BMC Vet. Res.* 10: 218.
- Qureshi, S.; Kataria , A. K. & Gahlot , T. K.** (2002). Bacterial microflora associated with wounds and abscesses on camel (*Camelus dromedarius*). *Journal of Camel Practice and Research*. 9 (2) .
- Ranjan, R., Vyas, S., Kashinath, S., Sonawane, G. & Patil, N.V.** (2018) Lymphadenitis caused by Corynebacterium pseudotuberculosis in a dromedary (*Camelus dromedarius*) Herd. *J. Camel Pract. Res.*, 25(1): 45-53
- Sahoo, S., & Ganguly, S.** (2015). Surgical management of abscess in camel: A Case Report. *World J. Biol. Medi. Sci*, 2(4), 32-4.
- Schwartz, H.J.**(1992). Productive performance and productivity of dromedaries (*Camelus dromedarius*). *Animal Research and Development* 35: 86–98.
- Solanki, S., & Kataria, A. K.,** (2017). Activities of some antibiotics against Staphylococcus Aureus Isolated from Camel. *Indian Journal of Comparative Microbiology, Immunology and Infectious Diseases*, 38(2), 80-84.

Thabet , A. EL . R . (1993) . Some microbial studies on lung of clinically healthy and respiratory infected camels (*Camelus dromedarius*). *Assiut Vet. Med . J.* 30 (59) : 188 – 191.

Tadesse, A., & Molla, B. (2002). Study on skin lesions of camels (*Camelus dromedarius*) associated with bacterial pathogens in North-Eastern Ethiopia. *Journal of Camel Practice and Research*, 9(1), 37-41.

Tejedor, M. T., Martin, J. L., Corbera, J. A., Shulz, U., & Gutierrez, C. (2004). Pseudotuberculosis in dromedary camels in the Canary Islands. *Tropical animal health and production*, 36(5), 459.

Tyagi, R. P. S., & Singh, J. (2012). Ruminant Surgery. 11th edn. *Pvt. Ltd. New Delhi*, pp.167- 174.

Venugopalan, A, (2000). *Doller's Veterinary Surgery*, 4th edn, CBS Publishers & Distributers, New Delhi, pp:770.

Wernery, U., & Kinne, J. (2016). Caseous lymphadenitis (pseudotuberculosis) in camelids: a review. *Austin Journal of Veterinary Science & Animal Husbandry*, 3, 1022.

Younan, M., Bornstein, S., & Glücks, I. V. (2007). Peri-articular abscesses in camel calves in North Kenya. *J. Camel Pract. Res.*, 14, 161-164.

Zidan, K. H., Mazloum, K., Saran, M. A., & Hatem, M. E. (2013). Abscesses in dromedary camels, sheep and goats etiology and pathology. *Medicine*, 47, 59.

Microbial flora of abscesses and wounds in Libyan camels

Abstract:

The laboratory investigation of 402 swab samples from abscesses and wounds in Libyan camels in 11 regions of Libya, showed the presence of 9 genera of bacteria. The study showed that the highest percentage was *Corynebacterium* by 44.3%, represented by (*Corynebacterium pyogenes*, *C. bovis* *C. Pseudotuberculosis*), *Staphylococcus* by 17.7%, (*Staphylococcus aureus* and *S.Epidermic*), *Eshrecia* 9.6% (*Eshrecia coli*), *Klabsiella*, 5.8 % (*Klabsiella pnemonae*), 3.8% *Enterobacter* (*Enterobacter aerogenosa*) , *Pseudomonas* 3.6% (*Pseudomonas erogenosa*), *Proteus* 4.4% (*Proteus vulgaris*), *Bacillus* 4.1% (*B.subtlis*), and *Micrococcus* 6.6%. The bacterial isolates was highest in Tarhuna and Misllata regions, and the lowest was in Misurata region. The highest rate of bacterial isolates was during the spring season 70.1%, where the lowest rate was during the summer with 7.8%. The sensitivity tests showed the effectiveness of Gentamycine on most bacterial isolates.

Keywords: Wounds, abscesses, Corynebacterium, pyogenic, staphylococcus, Eshrecia, Klabsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Proteus, Bacillus, Micrococcus, gentamicin